Eleotris Tolsoni, eene nieuwe soort van Java's westhoek nabij de Meeuwenbaai.

De heer R. P. Tolson, lid van een der voornaamste handelshuizen te Batavia, van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en van de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië, ontdekte tijdens zijn jongste verblijf aan de Meeuwenbaai in de in proefontginning zijnde kolenmijn eene soort van Eleotris, welke hij mij na zijne terugkomst te Batavia met de meeste welwillendheid afstond. Deze soort bleek mij weldra eene nog onbeschrevene te zijn, waarom ik haar, ter eere van den ontdekker, *Eleotris Tolsoni* genoemd heb. De kenmerken dezer nieuwe soort zijn de hieronder vermelde.

Eleotris Tolsoni Blkr.

Eleotr. corpore elongato compresso, altitudine $5\frac{1}{3}$ circiter in ejus longitudine, paulo altiore quam antice lato; capite pyramidali depresso acuto $4\frac{1}{4}$ circiter in longitudine corporis; altitudine et latitudine capitis $1\frac{1}{3}$ circiter in ejus longitudine; linea rostro-dorsali fronte et vertice declivi rectiuscula rostro tantum convexiuscula; oculis diametro $4\frac{1}{3}$ circiter in longitudine capitis, diametro $1\frac{2}{3}$ circiter distantibus; orbitis glabris; rostro antice alepidoto oculo vix breviore; naribus anterioribus tubulatis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviore sub oculi margine anteriore desinente; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa seriebus internis paulo majoribus caninis vel caninoïdeis nullis; sulco oculo-scapulari parum conspicuo; praeoperculo rotundato toto margine glabro; rostro postice, fronte, vertice, genis operculisque squamosis; squamis ctenoïdeis rostrum inter et pinnam dorsalem 1^{m} 17 vel 18, lateribus 28-30 p. m. in serie longitudinali; squamis lateribus postice et antice aequalibus; appendice anali oblonga rotundata; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa paulo humiliore obtusa spinis flexilibus 3^{a} et 4^{a} ceteris longioribus; dorsali radiosa corpore duplo circiter humiliore antice obtusa convexa postice acutangula; pectoralibus obtusis rotundatis, ventralibus acutis et caudali obtusa rotundata 5 circiter in longitudine corporis; anali convexa obtusa dorsali radiosa non humiliore; colore corpore superne aurantiaco-viridi inferne dilutiore; fascia cephalo-caudali fusca; regione oculo-operculari vittis 2 vel 3 longitudinalibus obliquis fuscis; pinnis aurantiacis, dorsalibus superne violascentibus dimidio basali vittis 2 longitudinalibus fusco-violaceis; pectorali basi macula fusca; anali inferne violascente.

B. 6. D. 6—1/9 vel 6—1/10. P. 14. V. 1/5. A. 1/9 vel 1/10. C. 32 p. m. (lat. brev. inclus.).

Habit. Prope Djunkulon, Javae extremitatis occidentalis, in aquis dulcibus.

Longitudo speciminis unici 85'''.

Aanm. Deze Eleotris is het naaste verwant aan *Eleotris Hoedtii* Blkr. van Amboina en beantwoordt daaraan zeer wel wat habitus en kleurteekening betreft. De verschillen zijn even wel nog vrij talrijk. Zoo mist *Eleotris Hoedtii* de donkere borstvinvlek, terwijl zij slechts 25 schubben op eene overlangsche rei der zijden en slechts 13 of 14 op eene overlangsche rei tusschen snuit en eerste rugvin heeft, de kop er spitser en lager is, enz.

Batavia, 15 Junij 1854. P. Bleeker.

Personaliën.

Dezer dagen is door den zich sedert eene lange reeks van jaren, zoo door zijnen ijver als kennis in de botanie gunstig onderscheiden hebbenden hortulanus bij s' lands plantentuin te Buitenzorg J. E. Teijsman, eene zilveren medaille ontvangen, hem toegekend door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den tuinbouw, voor door hem op de in het jaar 1853 door die maatschappij te 's Gravenhage gehouden negende Tentoonstelling, gezonden vruchten van *Vanilla aromatica*, zijnde hij de eerste geweest, die er in geslaagd is, die plant, welke sedert meer dan tien jaren op Java was overgebragt, echter zonder vruchten te geven, kunstmatig te bevruchten.

Het lid de heer Mr. A. Prins, is weder als gouvernements kommissaris naar de Wester afdeeling van Borneo vertrokken.

Het besturend lid de heer Crookewit is naar de Westkust van Borneo vertrokken tot het doen van wetenschappelijke nasporingen.

Vertrokken naar Cheribon tot het doen van astronomische plaatsbepalingen de vicepresident der Vereeniging de heer S. H. De Lange en de sekretaris der Vereeniging de heer G. A. De Lange, geografische ingenieurs van Nederlandsch Indië.

Bevorderd tot officie van gezondheid 1e kl. en geplaatst te en vertrokken naar Samarang, het lid der Vereeniging, de heer F. L. W. Vogler.

Aangekomen te Batavia van Palembang, het lid der Vereeniging, de heer F. Schneider.

In Nederland aangekomen het honorair lid der Vereeniging, de heer W. Bosch.

Geplaatst te Batavia het lid der Vereeniging, de heer G. J. Mohnike.

Vertrokken van Batavia naar Sumatra's Westkust de leden der Vereeniging de heeren G. Wassink, E. Netscher en G. C. Paum.